

Nadleśnictwo Supraśl informuje o trwających konsultacjach dotyczących planowanych na 2016 rok zadań gospodarczych na obszarach wyznaczonych lasów HCVF.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie do 30 dni od ukazania się poniższej listy zadań (t.j. do dnia 30.12.2015)

Wykaz i rozmiar planowanych prac w 2016 roku

(ha)

Zabieg	HCVF 1.1	HCVF 1.1.2	HCVF 1.2	HCVF 2.1	HCVF 3.1	HCVF 3.2	HCVF 4.1
CP	-	42,42	-	42,42	-	16,39	-
CW	-	53,58	-	53,58	-	23,15	-
IB	-	18,81	-	18,81	-	3,38	1,38
IIBU		0,68	-	0,68	-	-	0,68
IIIA	-	2,10	-	2,10	-	2,10	-
IIIAU		14,43	-	14,43	-	10,15	1,48
IIIB	-	38,30	-	38,30	-	18,48	11,73
IIIBU	-	5,25	-	5,25	-	5,25	-
TP	-	1057,96	-	1057,96	-	454,31	20,69
TW	-	99,79	-	99,79	-	133,27	9,22

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze nadleśnictwa

Słownik:

CW - czyszczenia wczesne – cięcia pielęgnacyjne wykonywane w uprawach leśnych do około 10 lat. Pierwszymi cięciami pielęgnacyjnymi, które przeprowadza się od momentu powstania uprawy są czyszczenia wczesne. Są one następstwem zabiegów wcześniej wykonywanych w uprawie czy nalocie, znanych pod nazwą pielęgnacji gleby i niszczenia chwastów. Czyszczenia wczesne obejmują cięcia pielęgnacyjne, które wykonuje się w pierwszych latach rozwoju odnowień sztucznych czy naturalnych aż do momentu dojścia do zwarcia.

CP - czyszczenia późne – Celem czyszczeń późnych jest doprowadzenie młodnika do etapu, jakim jest początek okresu drzewostanu dojrzewającego (tyczkowiny). Są to zabiegi przygotowujące drzewostan do pierwszej trzebieży i od jakości ich wykonania będzie zależał stan przyszłego drzewostanu.

Zgodnie z zadaniami czyszczeń późnych w okresie młodnika wykonuje się następujące czynności wchodzące w zakres cięć pielęgnacyjnych

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych
- usuwanie, ogławianie lub obrączkowanie zbędnych domieszek pozostałych z okresu czyszczeń wczesnych,
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika,
- usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających.

TW - trzebieże wczesne - Jest to okres wzmożonego, najintensywniejszego rozwoju drzew w tym maksymalnego nasilenia procesu wydzielania się drzew. W jednogatunkowych drzewostanach sosnowych na siedlisku boru świeżego okres ten przypada w wieku od 20 do 40 lat. Celem trzebieży wczesnych jest doprowadzenie drzewostanu dojrzewającego do etapu, jakim jest początek okresu drzewostanu dojrzałego. Drzewostan powinien wówczas osiągnąć pożądany skład gatunkowy zgodny z celem hodowlanym produkcji, cechować się wysoką jakością i pełnym zadrzewieniem

TP - trzebieże późne – ostatni etap cięć pielęgnacyjnych.
Rozpoczyna się je w drzewostanach, które przeszły już fazę najbardziej intensywnego przyrostu na wysokość i w których proces wydzielania się drzew zaczyna stopniowo słabnąć. Z chwilą przejścia do wieku dojrzałości drzewa przekroczyły już okres intensywnego przyrostu na wysokość.

rębnie zupełne- symbol I Istota rębni zupełnych polega na wycięciu jednym cięciem - tzw. zupełnym - wszystkich drzew drzewostanu dojrzałego, przeznaczonych do usunięcia podczas procesu jego odnowienia. Odslonięta powierzchnia (zrąb, poręba) jest zazwyczaj odnawiana sztucznie, rzadziej naturalnie w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego. Czynności związane z pozyskaniem, przygotowaniem gleby i odnowieniem są wyraźnie rozdzielone w czasie - następują na zrębie kolejno po sobie.

rębnie gniazdowe - symbol III - Stosujemy ją do przebudowy drzewostanów jednogatunkowych na wielogatunkowe. Polegają na usuwaniu lub przerzedzaniu drzewostanu na tzw. gniazdach w celu wprowadzenia gatunków współpanujących i domieszkowych. Po upływie pewnego czasu wykonuje się cięcie uprzątające, czyli usuwające pozostałe wokół gniazd drzewa.